РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита

№ 01180 – ПРЗ*

Дата на издаване: 28.12.2015 г.

Издание: 3/20.12.2017 г.**

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: **ДЕЦИС 100 ЕК**

Активно/и вещество/а:	**Производител/и:**
1. делтаметрин – 100 г/л	Байер КропСайънс АГ - Германия

Производител: **Байер КропСайънс СА - Франция**

Функция на продукта: **инсектицид**

Вид на формулацията: **емулсионен концентрат (ЕК)**

Категория за употреба: **втора професионална**

Размер и материал на опаковката:

Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба: **Байер България ЕООД**

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията, Заповед №РД 11-526/29.04.2013 г., Заповед №РД 11-1836/09.12.2015 г. и Заповед №РД 11-2609/01.12.2017 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за изменение на разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита.

Срок на валидност: **31.10.2019 г.**

---

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешение.

**Настоящето издание №03/20.12.2017 г. заменя всички досегашни разрешения.

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Име на продукта: ДЕЦИС 100 ЕК
Формулация: ЕК
Концентрация на активно/и вещество/а: делтаметрин – 100 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени		Листна въшка *(Hyalopterus spp.)*, ябълков плодов червей *(Laspeyresia pomonella)*, кестенов молец *(Laspeyresia splendana)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	*10,5 – 12,5 мл/дка*	40 до 140 л/дка		30 дни	
			Бадемов семеяд *(Eurytoma plotnikovi)*		в началото на цъфтежа			*12,5 мл/дка*				
2	Ябълки, круши, дюли, мушмули		Ябълков плодов червей *(Laspeyresia pomonella)*, ябълкова листна бълха *(Psylla mali)*, зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi)*, живовлекова листна въшка *(Dysaphis plantaginea)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	7,5 -12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		7 дни	

			Плодова корогризачка *(Adoxophyes orana)*,розена листозавивачка *(Archips rosanus)*					8,75 – 12,25 мл/дка				
			Обикновена крушова листна бълха *(Psylla pyri)*					12,25 мл/дка				
3	Праскови, нектарин,кайсии, сливи, череши, вишни		Плодова корогризачка *(Adoxophyes orana)*,розена листозавивачка *(Archips rosanus)*, прасковен молец *(Anarsia lineatella)*	ковенци онална техника	при поява на вредителя	1	-	8,75 – 12,25 мл/дка;	40 до 140 л/дка		7 дни	
			Черешова муха *(Rhagoleris cerasi), в доза 10 – 17,5 мл/дка.*					10 – 17,5 мл/дка.				
			Средиземноморска плодова муха *(Ceratitis capitata)*					12,5 – 17,5 мл/дка.				

			Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*, черешова листна въшка *(Myzus cerasi)*, прашеста сливова листна въшка *(Hyalopterus pruni)*, сливов плодов червей *(Laspeyresia funebrana)*					7,5 -17,5 мл/дка				
4	Лозя		Шарен гроздов молец *(Lobesia botrana)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	14 дни	12,5 *мл/дка* (първо поколение); 12,5 - 17,5 *мл/дка* (второ и трето поколение)	40 до 140 л/дка		7 дни	
			Еднопоясен гроздов молец *(Clysia ambiguella)*					12,5 - 17,5 мл/дка				
			Лозова цикадка *(Empoasca spp.), в доза* 12,5 *мл/дка*					12,5 *мл/дка*				
5	Ягоди	О	Листни въшки *(Aphis spp.)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	14 дни	6,25 – 12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		3 дни	

6	Кромид, праз, чесън		Тютюнев трипс *(Thrips tabaci)*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	14 дни	7,5 – 12,5 мл/дка			7 дни	
7	Домат, пипер и патладжан		Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*, малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua)*, колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata)*, зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*, памукова листна въшка *(Aphis gossypii)*, голяма сливова листна въшка *(Anuraphis cardui)*, *Hyperomyzus lactucae*	ковенционална техника	при поява на вредителя	4	7 дни	7,5 - 12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		3 дни	
			Южна зелена миризливка *(Nezara viridula)*					4,5 – 7,5 мл/дка				
			Подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза 7,5 – 12,5 мл/дка;*					7,5 – 12,5 мл/дка				

6	Пипер	О	Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*, малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua)*, колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata)*, зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*, памукова листна въшка *(Aphis gossypii)*, голяма сливова листна въшка *(Anuraphis cardui), Hyperomyzus lactucae*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	7 дни	7,5 – 17,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		3 дни	
			Южна зелена миризливка *(Nezara viridula), в доза 4,5 – 10,5 мл/дка;*					4,5 – 10,5 мл/дка				
			Оранжерийна белокрилка *(Trialeurodes vaporariorum)*					10,5 – 17,5 мл/дка				

7	Домат и патладжан	О	Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*, нощенки *(Spodoptera spp.)*, колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata)*, зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*, памукова листна въшка *(Aphis gossypii)*, голяма сливова листна въшка *(Anuraphis cardui)*, *Hyperomyzus lactucae*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	7 дни	7,5 – 12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		3 дни	
			Южна зелена миризливка *(Nezara viridula)*					4,5 – 10,5 мл/дка				
8	Краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини	П/О	Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*, нощенки *(Spodoptera spp.)*, листни въшки *(Aphis spp., Hyperomyzus lactucae)*, *в доза* 7,5 -12,5 *мл/дка* (на открито) 7,5 - 17,5 *мл/дка* (в оранжерия);	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	7 дни	7,5-12,5 *мл/дка* (на открито); 7,5-17,5 *мл/дка* (в оранжерия);	40 до 140 л/дка		3 дни	

			Подгризваща нощенка *(Agrotis spp) – на открито,*					7,5-12,5 мл/дка				
9	Зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи		Зелева пеперуда *(Pieris spp.),* зелева нощенка *(Mamestra brassicae),* гамозначна нощенка *(Plusia gamma),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* египетска памукова нощенка *(Spodoptera littoralis),* зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae),* зелева листна въшка *(Brevicorne brassicae),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	7,5-12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		7 дни	
			Диамантен молец *(Plutella xylostella)*					12,5 мл/дка				

10	Марули		Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*, малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua)*, сребристоточкова нощенка *(Chrysodeixis chalcites)*, листни въшки по салатата *(Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	7 дни	6,25-12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		14 дни	
			Подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*					7,5-12,5 мл/дка				
11	Спанак		Листни въшки *(Aphis spp.)*, малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua)*, зелева нощенка *(Mamestra spp.)*, сребристоточкова нощенка *(Chrysodeixis chalcites)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	8,75 мл/дка	40 до 140 л/дка		3 дни	

12	Магданоз, целина, рукола, цикория		Листни въшки *(Aphis spp.)*, Малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua)*, Зелева нощенка *(Mamestra spp.)*, сребристоточкова нощенка *(Chrysodeixis chalcites)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	8,75мл/дка	40 до 140 л/дка		3 дни	
			Подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*					7,5-12,5 мл/дка				
13	Фасул, леща, нахут		Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*, зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae, Aphis spp.)*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	7,5-12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		7 дни	
14	Грах		Зелена грахова листна въшка *(Acyrthosiphon pisum)*, грудков хоботник *(Sitona spp.), в доза 6,25 мл/дка;*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	6,25 мл/дка	40 до 140 л/дка		7 дни	

			черна бобова листна въшка *(Aphis fabae)*, тъмна грахова листозавивачка *(Laspeyresia nigricana)*, *Thrips angusticeps*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*					7,5-12,5 мл/дка				
15	Артишок		Щитовка *(Cassida spp.), в доза* 12,5 *мл/дка*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	7 дни	12,5 *мл/дка*	40 до 140 л/дка		3 дни	
			Тютюнев червей *(Spodoptera litura)*, листни въшки *(Anuraphis cardui, Myzus persicae)*					7,5-12,5 мл/дка				
16	Картофи		Колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata,)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	14 дни	12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		7 дни	
			Египетска нощенка по памука *(Spodoptera littoralis)*					*7,5* - 12,5 мл/дка				
17	Памук		Розов червей по памука *(Pectinophora gossypiella)*, памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	12,5 – 17,5 мл/дка			30 дни	

			Тютюнева белокрилка *(Bemisia tabaci)*, южна цикадка *(Empoasca spp.)*					12,5 мл/дка				
			нощенки *(Spodoptera spp.)*, памукова листна въшка *(Aphis gossypii)*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*					7,5-12,5 мл/дка				
18	Тютюн		Тютюнев трипс *(Thrips tabaci)*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp,)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	7 дни	7,5 – 12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		7 дни	
19	Захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло		Черна бобова листна въшка *(Aphis fabae)*, зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*, цвеклова муха *(Pegomya spp.)*, западна цвеклова бълха *(Chaetocnema tibialis)*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*, полска нощенка *(Spodoptera spp.), в доза* 7,5-12,5*мл/дка*	ковенционална техника	при поява на вредителя	1		7,5-12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		30 дни	
			Цвеклова щитовка *(Cassida nebulosa)*					12,5 мл/дка				

20	Царевица		Царевичен стъблен пробивач *(Ostrinia nubialis)*, *Sesamia nonagrioides*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*, полска нощенка *(Spodoptera spp.)*, памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*, брястова листна въшка *(Rhopalosiphum padi)*, овесена листна въшка *(Sitobion avenae)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	14 до 21 дни	7,5-12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		30 дни	
			Западен царевичен коренов червей *Diabrotica virgifera*,			3	7 до 14 дни	12,5 мл/дка				
21	Пшеница, ечемик, ръж, овес		Брястова листна въшка *(Rhopalosiphum padi)*, овесена листна въшка *(Sitobion avenae)*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	1		7,5-12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		-	
22	Люцерна		Грахова листна въшка *(Acyrthosiphon pisum)*, детелинов хоботник *(Apion pisi)*, малък люцернов листов хоботник *(Hypera postica)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	2	14 дни	6,25 мл/дка	40 до 140 л/дка		14 дни	

23	Декоративни растения		Листни въшки *(Myzus spp.)* Тютюнев трипс *(Thrips tabaci)*	ковенционална техника	при поява на вредителя	3	7 дни	6,25-12,5 мл/дка	40 до 140 л/дка		-	
			Листозавивачки *(Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.*					4,375-8,75 мл/дка				
			Оранжерийна белокрилка *(Trialeurodes vaporariorum)*					12,3 мл/дка				
24	Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале	П	Обикновен житен бегач (*Zabrus tenebrioides*)	Конвенционална наземна техника	При поява	2	14-21	7,5 мл/дка	10-20	0,75 г. а.в./дка	30	
25	Маслодайна рапица	П	Рапичен стъблен скритохоботник (*Ceutorhynchus napi*) Рапична стъблена бълха (P*sylliodes chrysocephalus*)Рапична листна оса (*Athalia rosae*) Рапичен цветояд (*Meligethes aeneus*)	Конвенционална наземна техника	При поява	4	14-21	5 мл/дка	10-15	0,5 г/дка	45	
			Листни въшки (Сем. *Aphididae*)					6,3 мл/дка		0,63 г. а.в./дка		

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложения та (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале	П	Листоминиращи мухи (сем. *Agromyzidae*), Галици (Сем. *Cecidomyiidae*) Цикади (сем. *Cicadellidae*)	Конвенционална наземна техника	При поява	2	14-21	6,3 мл/дка	10-20	0,63 г. а.в./дка	30	
			Голяма жълто-зелена въшка (*Metopolophium dirhodum*) Житна листозавивачка (*Cnephasia pascuana*)					7,5 мл/дка		0,75 г а.в./дка		
2	Сладка царевица	П	Светлокрака зелева бълха (*Phyllotreta nemorum*)	Конвенционална наземна техника	При поява	3	14	5 мл/дка	60	0.5 г/дка	3	

			Гамозначна нощенка (*Autographa gamma)*					7,5 мл/дка		0,75 г/дка		
			Средиземноморски царевичен стъблопробивач (*Sesamia nonagriodes)* Цикади (сем. *Cicadellidae*) Огневки (сем. *Pyralidae*)					12,5 мл/дка		1,25 г/дка		
3	Маслодайна рапица	П	Черен рапичен стъблен хоботник (*Ceutorhynchus picitarsis*), Светлокрака зелева бълха (*Phyllotreta nemorum*	Конвенционална наземна техника	При поява	4	14-21	5 мл/дка	10-15	0,5 г/дка	45	
			Зелев молец (*Plutella xylostella*					6,3 мл/дка		0,63 г. а.в/дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) РПИ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Запалими течности и пари Остра токсичност (орална): Категория 4 Опасност при вдишване: Категория 1 Сериозно увреждане на очите: Категория 1 Остра токсичност (инхалационна): Категория 4 Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция: Категория 3 Остра опасност за водната среда – категория 1 Хронична опасност за водната среда, категория 1	H226 H302 H304 H318 H332 H335 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H226 H302 H304 H318 H332 H335 H410	EUH066 EUH401	SP1, SPe3, SPe8

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 м при овощни и маслинови насаждения, 20 м при лозя и 10 м при зеленчукови и други подобни насаждения до повърхностни води с цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране. За да се защитят нецелевите членестоноги, да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м от необработваема земя.
Опасен за пчелите.Да не се прилага върху култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. След употреба пчелите трябва да останат в кошерите им за един ден, осигурявайки им храна и вода вътре или кошерите да се отдалечат

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 от 12.12.2017 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

На основание чл.50, ал.1 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница : www.babh.government.bg база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита